

南投縣十大死因性別分析知多少

中華民國 111 年

南投縣政府衛生局 編撰

中華民國 112 年 9 月

目 錄

壹、序言	- 1 -
貳、死亡原因統計之重要性	- 1 -
參、南投縣主要死亡原因	- 5 -
肆、南投縣主要死亡原因性別分析	- 6 -
伍、南投縣主要癌症死亡原因	- 8 -
陸、南投縣主要癌症死亡原因性別分析	- 10 -
柒、結論	- 12 -

壹、序言

一、人口、面積及位置：

本縣人口數 479,595 人，年中人口數為 482,246 人，男性 246,137 人、女性 236,110 人；面積 4,106.4360 平方公里，位居本島中央，台灣地理中心碑設於本縣埔里鎮，是全省唯一不濱海之縣份，面積遼闊，南北長約 95 公里，東西寬約 72 公里。

二、分析目的：

分析各種死亡原因之死亡人數，藉以瞭解其死因分佈及其順位，作為各級衛生單位、醫藥界防治宣導工作之重點。

三、資料範圍：

本分析資料係以南投縣主要死亡原因暨主要癌症死亡原因資料為分析範圍。

四、資料來源：

依據衛生福利部統計處資料公布。

五、分析方法：

本文分析方法主要係以主要死亡原因暨主要癌症死亡原因統計表之順位加以分析，由於資料來源有限，僅能作一般敘述之分析。

貳、死亡原因統計之重要性

死因統計可顯示一國人民生命之強弱及文化水準高低，也能比較人口壽命長短及國家綜合力量之重要的健康統計之一，經由死亡原因統計可大概瞭解縣民的死因情況，亦係各衛生機關及醫藥界防治工作之重點，藉此制定相關政策並視為評估各種疾病或傷害的防治計劃之成效指標。

111 年南投縣死亡人數 5,887 人較 110 年死亡人數 5,112 增加 775 人，每十萬人口死亡率 1220.7，較 110 年每十萬人口死亡率 1047.8 增加 172.9。

(一)惡性腫瘤：

南投縣十大死因中，惡性腫瘤續居十大死因之首，總死亡人數 1,265 人，其中男性 812 人、女性 453 人，占每十萬人口死亡率 262.3%。其中男性每十萬人口死亡率占 329.9%、女性占 191.9%，男性是女性的 1.72 倍。

男性前五大主要癌症為：1. 氣管、支氣管和肺癌 2. 肝和肝內膽管癌 3. 口腔癌 4. 結腸、直腸和肛門癌 5. 前列腺(攝護腺)癌；女性前五大癌症為：1. 氣管、支氣管和肺癌 2. 結腸、直腸和肛門癌 3. 女性乳癌 4. 肝和肝內膽管癌 5. 胰臟癌。

(二)心臟疾病（高血壓性疾病除外）：

心臟疾病總死亡人數 640 人，其中男性 335 人、女性 305 人，占每十萬人口死亡率 132.7%，為了保持健康的心臟我們應該戒菸、並維持正常體重、多運動、控制壓力、吃得健康。當然，在一生中我們的生活模式也會有失去平衡的時候，最重要的是盡量避免這些不平衡的情況出現。

(三)肺炎：

十大死亡原因中位居第 3 位為肺炎，總死亡人數 593 人，其中男性 347 人、女性 246 人，占每十萬人口死亡率 123.0%。常見的併發症--危險的肺炎，係指肺部實質的一種急性感染過程。可發生在所有年齡層，特別是免疫機能較差者，如老人、酗酒者或糖尿病患者。故其穩居十大死因之列。

(四)嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）：

新增之嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）位居第 4 位，總死亡人數 504 人，其中男性 297 人、女性 207 人，占每十萬人口死亡率 104.5%。

隨著疫情持續延燒，民眾應藉由均衡飲食及運動為健康打底，維持手部衛生習慣、避免出入人潮擁擠、維持社交距離或佩戴口罩等，並配合疫苗接種政策，才能有效預防。

（五）糖尿病：

糖尿病是國人高居十大死因之疾病，每年近萬人因糖尿病而死亡，本縣總死亡人數 339 人，其中男性 172 人、女性 167 人，占每十萬人口死亡率 70.3%。根據國際糖尿病聯盟（IDF）2006 年底的統計，全球估計有二億四千六百萬糖尿病人口，是十年前的兩倍以上；且預估到 2025 年全球罹患糖尿病人口將高達三億八千萬人。全球每年有 380 萬人死於糖尿病相關疾病，每 10 秒鐘就有 1 人死於糖尿病相關疾病；同時間（每 10 秒鐘）有 2 人新診斷出患有糖尿病，罹患糖尿病人口正在快速增加中。

（資料來源：國際糖尿病聯盟）

（六）腦血管疾病：

腦血管疾病（中風），總死亡人數 321 人，其中男性 177 人、女性 144 人，占每十萬人口死亡率 66.6%。由於中風後死去的腦細胞無法再生，因此中風後留下後遺症乃屬自然現象。造成腦血管疾病之因素中，肥胖容易併發高血壓和糖耐受異常，增加罹患腦梗塞的機率。適當的運動可以預防冠狀動脈疾病，降低血糖和血脂，亦可減輕體重，且得避免發生中風危險因子的危害，對於腦血管有保護的作用。

(七)高血壓性疾病：

高血壓性疾病總死亡人數 309 人，男性 159 人、女性 150 人，占每十萬人口死亡率 64.1%。能附帶引起其他疾病並併發腦中風，因而高血壓嚴重威脅中老年人的健康，成為慢性病防治工作中最重要的一環。

(八)慢性下呼吸道疾病：

慢性肺阻塞、氣喘、支氣管炎的「慢性下呼吸道疾病」，總死亡人數 230 人，其中男性 172 人、女性 58 人，占每十萬人口死亡率 47.7%。呼吸道感染之疾病係由於空氣及人們抽菸的污染，又台灣屬海島型氣候較潮濕，且入秋後早晚溫差大，易導致此現象之產生。

(九)事故傷害：

事故傷害係指非蓄意性事故傷害，總死亡人數為 228 人，其中男性 157 人、女性 71 人，占每十萬人口死亡率為 47.3%。事故傷害引起的原因，主要包括運輸事故（機動車交通事故）、意外中毒、意外墜落、火及火燄所致之意外事故、意外之淹死及溺水等，其意外死亡人數持續增加的趨勢，這和交通情況惡化、產業設備不良有著相當大的關係。

(十)腎炎、腎病症候群及腎性病變：

腎炎、腎病症候群及腎病總死亡人數 190 人，男性 100 人、女性 90 人，占每十萬人口死亡率為 39.4%，腎炎是腎臟的某一部分發生炎症，如果發生在腎盂則稱為腎盂腎炎，如果發生在腎小球，則稱為腎小球腎炎。腎炎分為急性和慢性腎炎。慢性腎炎患者尤其要注意生活調養，飲食清淡是患者在飲食上的基本要求，鹽的攝取量尤其要控制。


參、南投縣主要死亡原因

111 年全縣十大死因中，前五大死亡原因就占總死亡人數 56.9%(如表 1)，就性別觀察，多呈現男性高於女性的現象。

所有死亡人數為 5,887 人，依照死亡原因之順位，惡性腫瘤排名為首要、心臟疾病(高血壓性疾病除外)排名第二、肺炎排名第三、嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 排名第四、糖尿病排名第五、腦血管疾病排名第六、高血壓性疾病排名第七、慢性下呼吸道疾病排名第八、事故傷害排名第九、腎炎、腎病症候群及腎病變排名第十(如圖 1-1)。

表 1、南投縣 111 年主要死亡原因

順位	合					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率	
	A00-Y98	所有死亡原因	5,887	1,220.7	519.0	100.0
1	C00-C97	惡性腫瘤	1,265	262.3	121.2	21.5
2	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病(高血壓性 疾病除外)	640	132.7	52.2	10.9
3	J12-J18	肺炎	593	123.0	41.6	10.1
4	U07.1	嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19)	504	104.5	38.4	8.6
5	E10-E14	糖尿病	339	70.3	28.8	5.8
6	I60-I69	腦血管疾病	321	66.6	26.7	5.5
7	I10-I15	高血壓性疾病	309	64.1	22.7	5.2
8	J40-J47	慢性下呼吸道疾病	230	47.7	16.7	3.9
9	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	228	47.3	28.1	3.9
10	N00-N07, N17-N19, N25-N27	腎炎、腎病症候群及 腎病變	190	39.4	15.2	3.2
		其他	1,268	262.9	127.4	21.5




肆、南投縣主要死亡原因性別分析

（一）男性主要死亡原因：

111年本縣男性死亡人數為 3,462 人，男性十大死因以惡性腫瘤為首，依序為肺炎、心臟疾病（高血壓性疾病除外）、嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）、腦血管疾病、糖尿病、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性肝病及肝硬化。

111年男性主要死亡原因與上年相較，惡性腫瘤、肺炎及心臟疾病（高血壓性疾病除外），均居前3位，新增之嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）居第4位，腦血管疾病、慢性下呼吸道疾病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性肝病順序下降，但糖尿病順序往上升；男性十大死因死亡人數佔總死亡人數為 58.8%，其中惡性腫瘤男性死亡人數為 812 人占 23.5%居冠（如圖 1-2）。


圖1-2 南投縣男性主要死亡原因



(二) 女性主要死亡原因：

111 年本縣女性死亡人數為 2,425 人，女性十大死因以惡性腫瘤為首，依序為心臟疾病（高血壓性疾病除外）、肺炎、嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）、糖尿病、高血壓性疾病、腦血管疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變、事故傷害、衰老/老邁。

111 年女性主要死亡原因與上年相較，惡性腫瘤、心臟疾病（高血壓性疾病除外）及肺炎，均居前 3 位，新增之嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）居第 4 位，糖尿病、腦血管疾病、腎炎、腎病症候群及腎病變、事故傷害、衰老/年邁順序下降，高血壓性疾病順序不變；女性十大死因死亡人數佔總死亡人數為 41.19%，其中惡性腫瘤女性死亡人數為 453 人占 18.7%居冠(如圖 1-3)。



伍、南投縣主要癌症死亡原因

本縣 111 年惡性腫瘤死亡人數，依死亡原因順位，氣管、支氣管和肺癌排名首位，肝和肝內膽管癌排名第二，結腸、直腸和肛門癌排名第三，口腔癌排名第四，女性乳癌排名第五，前列腺(攝護腺)癌排名第六，食道癌排名第七，胰臟癌排名第八，胃癌排名第九，膀胱癌排名第十(如圖 2-1)。



主要癌症死亡原因中，惡性腫瘤十大死亡原因中氣管、支氣管和肺癌死亡人數 242 人，其中男性 162 人、女性 80 人，占總死亡人數 19.1%。肝和肝內膽管癌死亡人數 188 人，其中男性 133 人、女性 55 人，占總死亡人數 14.9%。結腸、直腸和肛門癌死亡人數 182 人，其中男性 104 人、女性 78 人，占總死亡人數 14.4%，口腔癌死亡人數 126 人，其中男性 113 人、女性 13 人，占總死亡人數 10.0%。前四大死亡原因就占總死亡人數 58.4%(如表 2)。

表 2、南投縣主要癌症死亡原因

單位：人、每十萬人口、%

順位	死亡原因	死亡人數			每十萬人口		死亡人數
		合計	男	女	死亡率	標準化死亡率	結構比 %
	惡性腫瘤	1,265	812	453	262.3	121.2	100.0
1	氣管、支氣管和肺癌	242	162	80	50.2	22.2	19.1
2	肝和肝內膽管癌	188	133	55	39.0	17.3	14.9
3	結腸、直腸和肛門癌	182	104	78	37.7	16.7	14.4
4	口腔癌	126	113	13	26.1	13.4	10.0
5	女性乳癌	56	-	56	23.7	12.5	4.4
6	前列腺(攝護腺)癌	51	51	-	20.7	8.4	4.0
7	食道癌	52	49	3	10.8	6.2	4.1
8	胰臟癌	52	31	21	10.8	5.2	4.1
9	胃癌	40	23	17	8.3	3.4	3.2
10	膀胱癌	40	27	13	8.3	3.0	3.2
	其他	236	100	87	48.9	24.1	18.7


資料來源：本研究整理

陸、南投縣主要癌症死亡原因性別分析

(一) 男性主要癌症死亡原因：

111 年本縣主要癌症惡性腫瘤男性死亡人數為 812 人，惡性腫瘤死亡原因以氣管、支氣管和肺癌為首，依序為肝和肝內膽管癌、口腔癌、結腸直腸和肛門癌、前列腺(攝護腺)癌、食道癌、胰臟癌、膀胱癌、胃癌、非何杰金氏淋巴瘤。


111 年男性主要癌症死亡原因與上年相較，氣管、支氣管和肺癌、肝和肝內膽管癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌死亡原因順序不變，結腸直腸和肛門癌、前列腺(攝護腺)癌、膀胱癌、非何杰金氏淋巴瘤順位上升，食道癌順位下降；主要癌症惡性腫瘤總死亡人數為 1,265 人，男性惡性腫瘤 812 人，男性佔總死亡人數 64.19%，其中氣管、支氣管和肺癌男性死亡人數為 162 人占 20.0%居冠(圖 2-2)。



(二)女性主要癌症死亡原因：

111年本縣主要癌症惡性腫瘤女性死亡人數為453人，惡性腫瘤死亡原因以氣管、支氣管和肺癌為首，依序為結腸直腸和肛門癌、女性乳癌、肝和肝內膽管癌、胰臟癌、胃癌、子宮頸及部位未明示子宮癌、卵巢癌、非何杰金氏淋巴瘤、口腔癌。

111年女性主要癌症死亡原因與上年相較，氣管、支氣管和肺癌、女性乳癌、胰臟癌、非何杰金氏淋巴瘤、口腔癌死亡原因順序不變，結腸直腸和肛門癌、胃癌、卵巢癌順位上升，肝和肝內膽管癌、子宮頸及部位未明示子宮癌順位下降；主要癌症惡性腫瘤總死亡人數為1,265人，女性惡性腫瘤453人，女性佔總死亡人數35.81%，其中氣管、支氣管和肺癌女性死亡人數為80人占17.7%居冠(圖2-3)。



柒、結論

綜上所述可知，南投縣十大死因在近 10 年來除事故傷害外，其餘各項死亡原因均以慢性病為主，近年來，慢性疾病已經超過急性傳染，成為國人健康最大的殺手。引起慢性疾病的原因很多，飲食是其中重要的因素之一，均衡的飲食可以促進健康，飲食不當卻是各種慢性病的來源。長期以來國人因為營養過剩，飲食習慣趨向於西式飲食，因此，像肥胖症、糖尿病及心血管疾病等慢性疾病的罹患率，都逐年增加。中年以後各種生理機能逐漸衰退，各種慢性疾病逐漸出現，所謂「預防勝於治療」，為了維持正常的生理機能，預防慢性疾病，日常飲食保健伴以適當之運動更為重要。