



珍惜生命~南投縣自殺通報性別統計

為落實自殺防治，本府衛生局針對自殺個案進行統計分析，在112年度統計資料中，本縣自殺通報(含企圖及死亡)人數計1189人，其中女性683人，男性506人，女性通報人數大於男性。而在自殺死亡方面，人數計87人，其中女性31人，男性56人，男性死亡人數大於女性。

111年自殺死亡性別比



112年自殺死亡性別比



對比同期數據：111年1-12月份，在自殺通報方面，女性人數同樣大於男性，自殺死亡人數則同樣男性大於女性。

本期 112 年 1-12 月份自殺通報與死亡個案					
112 年	總人數	女性人數	女性比	男性人數	男性比
自殺通報個案	1189	683	57%	506	43%
自殺死亡個案	87	31	36%	56	64%
前期 111 年 1-12 月份自殺通報與死亡個案					
111 年	總人數	女性人數	女性比	男性人數	男性比
自殺通報個案	879	505	57%	374	43%
自殺死亡個案	86	32	37%	54	63%

在 112 年度，女性自殺年齡層前三位分別為 15~19 歲(86 人，7.2%)、20~24 歲(77 人，6.5%)及 40~44 歲(65 人，5.5%)；男性自殺年齡層前三位分別為 40~44 歲(65 人，5.5%)、25~29 歲(59 人，5%)及 30~34 歲(55 人，4.6%)。

年齡層	女	百分比	男	百分比	總計
5~9 歲	2	0.2%	2	0.2%	4
10~14 歲	39	3.3%	19	1.6%	58
15~19 歲	86	7.2%	30	2.5%	116
20~24 歲	77	6.5%	36	3.0%	113
25~29 歲	52	4.4%	59	5.0%	111
30~34 歲	58	4.9%	55	4.6%	113
35~39 歲	43	3.6%	39	3.3%	82
40~44 歲	65	5.5%	65	5.5%	130
45~49 歲	59	5.0%	43	3.6%	102
50~54 歲	41	3.4%	19	1.6%	60
55~59 歲	30	2.5%	31	2.6%	61
60~64 歲	40	3.4%	33	2.8%	73
65~69 歲	31	2.6%	18	1.5%	49
70~74 歲	16	1.3%	20	1.7%	36
75~79 歲	13	1.1%	9	0.8%	22
80~84 歲	19	1.6%	14	1.2%	33
85 歲以上	12	1.0%	14	1.2%	26

在 112 年度，女性自殺原因前三位分別為憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病(209 人，17.6%)、家庭成員問題(121 人，10.2%) 及夫妻問題(86 人，7.2%)；男性自殺原因前三位分別為憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病(109 人，9.2%)、家庭成員問題(69 人，5.8%)、感情因素(如男女朋友)(54 人，4.5%)。

自殺原因	女	百分比	男	百分比	總計
不詳	26	2.2%	44	3.7%	70
夫妻問題	86	7.2%	51	4.3%	137
失業	2	0.2%	13	1.1%	15
生涯規劃因素	1	0.1%	0	0.0%	1
其他	22	1.9%	22	1.9%	44
物質濫用(酒、藥、毒品)	13	1.1%	15	1.3%	28
急性化的疾病問題(如：初得知患病)	2	0.2%	6	0.5%	8
畏罪自殺、官司問題	1	0.1%	6	0.5%	7
個案(家屬)不願說明	9	0.8%	13	1.1%	22
個案因身體狀況無法說明	7	0.6%	10	0.8%	17
家庭成員問題	121	10.2%	69	5.8%	190
喪親、喪偶	9	0.8%	3	0.3%	12
債務	8	0.7%	23	1.9%	31
感情因素(如男女朋友)	73	6.1%	54	4.5%	127
慢性化的疾病問題(如：久病不癒)	42	3.5%	42	3.5%	84
憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病	209	17.6%	109	9.2%	318
遭受詐騙	3	0.3%	1	0.1%	4
遭受暴力	3	0.3%	0	0.0%	3
遭受騷擾	2	0.2%	0	0.0%	2
學校適應問題(如課業壓力、體罰、霸凌等)	19	1.6%	15	1.3%	34
職場工作壓力	25	2.1%	10	0.8%	35

在 112 年度，女性所採用自殺方式前三位分別為安眠藥鎮靜劑(169 人，14.2%)、割腕(157 人，13.2%)及除了上列方式之外之自殺方式(83 人，7%)；男性所採用自殺方式前三位分別為安眠藥鎮靜劑(91 人，7.7%)、除了上列方式之外之自殺方式(79 人，6.6%)及割腕(56 人，4.7%)。

自殺方式	女	百分比	男	百分比	總計
一般病媒殺蟲劑(如：蟑螂、螞蟻、老鼠藥等)	4	0.3%	3	0.3%	7
一般農藥(如：農用殺蟲劑、除草劑、生長劑等)	40	3.4%	54	4.5%	94
上吊、自縊	31	2.6%	45	3.8%	76
化學物品(如：漂白水清潔劑、鹽酸等)	12	1.0%	12	1.0%	24
巴拉刈農藥	3	0.3%	2	0.2%	5
以鎗砲、氣槍及爆炸物	0	0.0%	1	0.1%	1
安眠藥鎮靜劑	169	14.2%	91	7.7%	260
自焚	1	0.1%	3	0.3%	4
汽車廢氣	0	0.0%	2	0.2%	2
其他部位之切穿工具	20	1.7%	27	2.3%	47
服用或施打毒品過量	2	0.2%	1	0.1%	3
臥、跳軌(含鐵路、捷運等)	0	0.0%	1	0.1%	1
家用瓦斯	4	0.3%	2	0.2%	6
除了上列方式之外之自殺方式	83	7.0%	79	6.6%	162
除安眠藥鎮靜劑之外藥物	48	4.0%	19	1.6%	67
高處跳下	59	5.0%	48	4.0%	107
割腕	157	13.2%	56	4.7%	213
悶死及窒息(如塑膠袋套頭)	1	0.1%	0	0.0%	1
溺水(淹死);跳水	14	1.2%	11	0.9%	25
溺水(淹死);跳水	1	0.1%	0	0.0%	1
撞擊(如：撞牆、撞車等)	18	1.5%	10	0.8%	28
燒炭	16	1.3%	39	3.3%	55