

各項常規疫苗接種年齡

| 疫 苗 | 劑次 | 建議接種 時程 |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| 卡介苗(BCG) | 一劑 | 5-8 個月 [*] |
| B 型肝炎疫苗(HepB) | 第一劑 | 出生 24 小時內儘速 |
| | 第二劑 | 1 個月 |
| | 第三劑 | 6 個月 |
| 白喉破傷風非細胞性百日咳、b 型嗜 桿菌及不活化小兒麻痺五合一疫苗 (DTaP-Hib-IPV) | 第一劑 | 2 個月 |
| | 第二劑 | 4 個月 |
| | 第三劑 | 6 個月 |
| | 第四劑 | 18 個月 [#] |
| 13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗(PCV13) | 第一劑 | 2 個月 |
| | 第二劑 | 4 個月 |
| | 第三劑 | 12~15 個月 |
| 水痘疫苗(Varicella) | 一劑 | 12 個月 |
| 麻疹腮腺炎德國麻疹疫苗(MMR) | 第一劑 | 12 個月 |
| | 第二劑 | 滿 5 歲 |
| 日本腦炎疫苗(JE) | 第一劑 | 15 個月 |
| | 第二劑 | 15 個月 |
| | 第三劑 | 27 個月 |
| | 追加 | 滿 5 歲 |
| 減量破傷風白喉非細胞性百日咳及 不活化小兒麻痺疫苗(Tdap-IPV) | 一劑 | 滿 5 歲 |
| A 型肝炎疫苗(HepA) | 第一劑 | 12 個月 |
| | 第二劑 | 18 個月 |

^{*}105年1月1日起卡介苗接種時程調整為出生滿5-8個月。[#]因應全球五合一疫苗缺貨，第4劑接種年齡延後至出生滿27個月。