

# 我國現行兒童預防接種時程

108.05 版

| 疫苗   | 接種年齡 | 24hr 內<br>儘速 | 1<br>month | 2<br>months | 4<br>months | 5<br>months | 6<br>months | 12<br>months      | 15<br>months | 18<br>months | 21<br>months | 24<br>months | 27<br>months | 滿 5 歲至<br>入國小前 | 國小<br>學童 |
|--|------|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| B 型肝炎疫苗<br>(Hepatitis B vaccine)   |      | 第一劑          | 第二劑        |             |             |             | 第三劑         |                   |              |              |              |              |              |                |          |
| 卡介苗<br>(BCG vaccine) <sup>1</sup>  |      |              |            |             |             | 一劑          |             |                   |              |              |              |              |              |                |          |
| 白喉破傷風非細胞性百日咳、<br>b 型嗜血桿菌及不活化小兒麻痺<br>五合一疫苗<br>(DTaP-Hib-IPV)                    |      |              |            | 第一劑         | 第二劑         |             | 第三劑         |                   |              | 第四劑          |              |              |              |                |          |
| 13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗<br>(PCV13)  |      |              |            | 第一劑         | 第二劑         |             |             | 第三劑               |              |              |              |              |              |                |          |
| 水痘疫苗<br>(Varicella vaccine)  |      |              |            |             |             |             |             | 一劑                |              |              |              |              |              |                |          |
| 麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗<br>(MMR vaccine)   |      |              |            |             |             |             |             | 第一劑               |              |              |              |              |              | 第二劑            |          |
| 活性減毒嵌合型日本腦炎疫苗<br>(Japanese encephalitis live<br>chimeric vaccine) <sup>2</sup> |      |              |            |             |             |             |             |                   | 第一劑          |              |              |              | 第二劑          | 一劑*            |          |
| 流感疫苗<br>(Influenza vaccine) <sup>3</sup>                                       |      |              |            |             |             |             |             | ← 初次接種二劑，之後每年一劑 → |              |              |              |              |              |                |          |
| A 型肝炎疫苗<br>(Hepatitis A vaccine) <sup>4</sup>                                  |      |              |            |             |             |             |             | 第一劑               |              | 第二劑          |              |              |              |                |          |
| 白喉破傷風非細胞性百日咳<br>及不活化小兒麻痺混合疫苗<br>(DTaP-IPV)                                     |      |              |            |             |             |             |             |                   |              |              |              |              |              | 一劑             |          |

1.105年起，卡介苗接種時程由出生滿24小時後，調整為出生滿5個月(建議接種時間為出生滿5-8個月)。

2.106年5月22日起，改採用細胞培養之日本腦炎活性減毒疫苗，接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑。

\*針對完成3劑不活化疫苗之幼童，於滿5歲至入國小前再接種1劑，與前一劑疫苗間隔至少12個月。