

A型肝炎疫苗接種須知

認識疾病

- A型肝炎是感染A型肝炎病毒所造成的急性肝臟發炎，其主要是經由糞口途徑傳播，包括食用、飲用受病毒污染的食物或與感染者密切接觸。
- 感染A型肝炎之症狀包括疲倦、厭食、發燒，黃疸、尿的顏色變濃、上腹部疼痛等。大多數會自然痊癒，然後產生抗體。惟極少數病例會發生猛爆型肝炎，嚴重的話可能致死，致死率約千分之三。
- 接種A型肝炎疫苗為有效的預防方法。

認識疫苗

- A型肝炎疫苗的安全性及接種效益很高，一般接種1劑疫苗後，約95%以上可產生保護抗體，完成2劑疫苗接種，可提供20年以上的保護力。
- 國內現行上市的A型肝炎疫苗有三種廠牌，均為不活化疫苗，核准的接種年齡為出生滿12個月以上，接種劑次無論成人或兒童都是2劑，2劑間隔至少6個月。

幼兒A型肝炎預防接種計畫

本計畫所用疫苗由財團法人寶佳公益慈善基金會捐贈

- 實施時間：民國107年1月1日起。
- 實施對象：民國106年1月1日(含)以後出生，年滿12個月以上之幼兒。
- 接種地點：全國提供預防接種服務之衛生所(室)及各縣市合約之醫院診所。
- 攜帶證件：兒童健康手冊、健保IC卡。

接種時程與接種間隔

- 幼兒常規接種時程：應接種2劑
出生滿12-15個月接種第1劑，間隔至少6個月接種第2劑。
- 可與其他活性減毒或不活化疫苗同時(分開不同部位)或間隔任何時間接種。

哪些人不適合或宜暫緩接種A型肝炎疫苗及應注意事項

| 接種禁忌 | 注意事項 |
|------------------------------------|---|
| 對本疫苗之任何成分(含賦形劑、Neomycin)曾有嚴重過敏反應者。 | 下列狀況者，宜待病情穩定後或經醫師評估後再接種： <ul style="list-style-type: none">● 發燒或正患有急性中重度疾病者。● 孕婦 |

接種後可能發生的不良反應及因應方式

- 一般為注射部位疼痛、紅、腫、頭痛、發燒、肌痛、煩躁不安、食慾不振及腸胃不適等反應，會在數天內恢復。至於嚴重過敏等症狀則極為罕見。
- 如上述症狀持續未獲改善，應儘速就醫處理，並請醫師通報衛生單位。

如您仍有預防接種等相關問題，歡迎就近洽詢所在地衛生局(所)，或至疾病管制署網站 www.cdc.gov.tw 查詢，亦可撥打防疫諮詢專線1922洽詢。



衛生福利部疾病管制署 關心您